

*Dissertatio inauguralis Chirurgico -
- Medica de Prolapsu et Inversione
uteri eiusque Vaginae Relaxatione*

J

XVIII

P

18

59583/p

LB4

7/1-

Cat 63-707

J XVIII p

18

47386
J. Glentz

DISSERTATIO INAUGVRALIS CHIRVRGICO-MEDICA
DE

PROLAPSV ET INVERSIONE
V T E R I

EIVSQVE
VAGINAE RELAXATIONE

QVAM
SVB AVSPICIO SYMMI NVMINIS
GRATIOSI ORDINIS MEDICI CONSENSV ET AVCTORITATE
. PRAESIDE

DN. D. PHILIPPO ADOLPHO
BOEHMERO

MEDICINAE ET ANATOMIAE PROFESSORE
PVBLICO ORDINARIO

PRO GRADV DOCTORIS
SYMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
DOCTORALIBVS LEGITIME IMPETRANDIS

H. L. Q. C.

ANNO MDCCXLV. D. XVIII. IVNII

DEFENDET

AVCTOR RESPONSVRVS

FRIDERICVS BENIAMIN WACHTER.

NORDHVSA - THVRINGVS.

HALAE MAGDEBVRGICAE
TYPIS IOANNIS FRIDERICI GRVNERTI.

DISSERTATION IN AGRICULTURE

BY

ROBERT M. BENTON

V T B I

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

V I R I S.

MAGNIFICIS. CONSVLTISSIMIS.

DOCTISSIMIS. ATVE. AMPLISSIMIS.

IMPERIALIS. NORDHVSÆ.

CONSVLIBVS. GRAVISSIMIS.

CIVITATIS. PATRIÆ. PATRIBVS.

LONGE. MERITISSIMIS.

RELIQVISQVE.

SPECTATISSIMIS.

MAGNIFICI. SENATVS.

MEMBRIS.

FAVTOBIBVS. ET. PATRONIS.

OMNI. HONORIS. CVLTV. IN. AETERNVM.

PROSEQVENDIS.

2 HASCE
LITTERARVM. PRIMITIAS.

VT POTE.

PERPETVVM. PIETATIS. MONVMENTVM.

INTER. ARDENTISSIMA.

PRO. PERENNI INCOLVMITATE. ET. SALVTE.

V O T A.

EA. QVA. DECET. ANIMI. OBSERVANTIA.

D. D. D.

FRIDERICVS. BENIAMIN. WACHTER.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30347142>

T A B V L A

VARIAS PESSARIORVM SPECIES REPRAESENTAT

ET QUIDEM

- Fig. I. Formam pessarii ellipticam.
- Fig. II. Ellipticam circulo propius accedentem, intus
excauatam, cum foramine in acutum ten-
dente.
- Fig. III. Triangularem, cuius latera sunt circularia, ra-
tione structuræ priori fere similem, foris lati-
tudine duorum digitorum gaudentem, magis-
que in acutum a circumferentia centrum ver-
sus desinentem.
- Fig. IV. Orbicularem non adeo profundam.
- Fig. V. Planam rotundam fere quadrangularem.
- Fig. VI. Rotundam, in forma annuli extus conuexam,
intus concavam.
- Fig. VII. Oualem seu oui formam referentem.
- Fig. VIII. Demum exhibet pessarium, quo MESNARD
vsus in curanda vaginæ vterinæ relaxatione.
Figuram quidem campanæ habet, duo autem
orificia, superius h. h. et inferius i. i. circa quod
filum i. g. i. pessario adnexumprehenditur,
quo urgente necessitate rursus extrahi possit.

Fig. V.




Fig. VIII.




Fig. IV.




Fig. VII.



Fig. VI.





Fig. I.

Fig. III.





Fig. II.







DISSERTATIO INAUGVRALIS CHIRVRGICO - MEDICA
 DE
 PROLAPSV ET INVERSIONE VTERI
 EIVSQUE
 VAGINAE RELAXATIONE.



PRAEFAMEN.

Quum in accurato causarum scruti-
 nio medentis labor versetur,
 cognitionem earum exquisi-
 tam medico adeo necessariam
 iudicamus, vt sine illa nec mor-
 bos rite distinguere, nec rationalem princi-
 piis veris superstructam suscipere possit cura-
 tionem.

tionem. Optime enim ille curat, qui morbum bene cognoscit. Quare HIPPOCRATES *Lib. de Flatibus, causas, inquit, morbi bene cognoscens, valde potens est ea afferre, quæ corpori commodent, nimirum contraria morborum natura perspecta; libroque de natura humana, curationem, ita instituire iubet, ut causæ morbi nos opponamus; quo simul referendum CELSI effatum: Causæ investigatio eiusque primordia et occasio in affectionis et remediorum cognitionem deducunt amplissimam.* Licet vero arctus causarum inter se nexus earumque infinitus fere progressus sit, primariæ tamen tantum ex his, utpote formæ et materialis, deinde quæ his antecedunt, tam internæ quam externæ a veteribus κατ' ἐξοχὴν προηγμέναι καὶ προκαταρκτικάι dictæ, examini et scrutinio medico subiici debent. Perspecto enim hoc causarum ordine, omnis medela tam ad motum quam ad materiam dirigitur, cognitio autem earum quid valeat in sanandis morbis, ex praxi optime diiudicatur, sub quarum examine rite instituto nonnullas diiudicatu esse faciliores, difficiliore alias et magis occultas, pro ratione nimirum morbo-

morborum internorum et externorum, quotidiana confirmatur experientia. Moriuntur plurimi et causa mortis ignoratur. Quando puerperæ diem supremum obeunt, raro inquiritur in causas mortis. Qui veram causam haud intelligunt, malignitatem imaginariam, aut nescio quid, accusant, mechanicas omittendo rationes. Hæc fuit ratio, cur mecum constituerim, in præsentiarum examinandi affectus quosdam uterinos, quo, quid rationalis eorum diiudicatio et iusta remedium applicatio ad curationem felicem instituendam et eiusmodi effectus præcavendos valeat, probe cognoscamus. Elegi mihi thema aliquod de uteri prolapsu et inversione nec non vaginæ relaxatione pertractandum, fructuosum omnino, medicoque scitu necessarium, etsi ad forum chirurgicum maxime pertineat. Ansam mihi præbuere, casus varii, et affectus quidam inueterati, quorum curatio feliciter successit. In memoriam revoco observationes, quas in theatro anatomico hinc inde Excell. Dominus Præses indefesso labore et accurato scrutinio fecit, quibusque indagandis confluxus cadauerum vte-

ri affectibus mortuorum commodam haec-
nus prae-buit occasionem. Vnicam ex his me-
cum benevole communicatam referre liceat
historiam. „Virgo cachectica XXX anno-
„rum, per plures annos laboravit fluore albo
„benigno, succedente ipsi prius prolapsu ute-
„ri incompleto, postea vero completo facto.
„Dedecus sibi metuit a chirurgorum auxilio,
„forfan ex verecundia, quæ custas virtutum
„omnium dicenda, hinc nulla alia a medicis
„sibi expetiit medicamenta quam evacuantia,
„purificantia, et quæ specificam habere dicun-
„tur virtutem in fluore albo. Contigit vero
„causa mali minus cognita, infelix curatio, et
„tristis rei eventus. Sectione post mortem
„instituta, partes fere omnes sanas præter in-
„flammationem vteri eiusque prolapsum com-
„pletum invenimus. Magnitudo huius pro-
„lapsus extra genitalia erat instar capitis fœ-
„tus, pars superior eius admodum constricta,
„inferior in circulum maiorem expansa et val-
„de rugosa, orificium vteri ita angustum, ut
„vix ac ne vix quidem acu in cavitatem vteri
„penetrare potuerimus. Ligamenta non dis-
„rupta sed relaxata nimis, pelvis ampla et ro-
„tunda,

„tunda, vesica vrinaria lotio, et intestinum
„rectum scybalis induratis repleta, partesque
„omnes inferiores inflammatae obseruaban-
„tur.„ Facillime quilibet originem prola-
psus a causa interna et illi succedentem statum
inflammatorium et lethalem diiudicare pot-
erat, et experiri, quid accurata et completa
morbi historia ad cognitionem causae valeat?
Differt enim illa, quae vel ab ægroto perfecte
enarratur, vel quaestionibus ordine propositis
eruitur, a vulgari et empirica methodo, qua
compendiose plures sine habito respectu ad na-
turam ægri, statum antecedentem et præsen-
tem, vel per generalia medicamenta, vel per
specifica non satis dilaudanda, causas in genere
remouere conantur. Alta admiratione di-
gnus erat locus iste humilis, quo veritas con-
firmaretur, accidere sæpius in virginibus eius-
modi prolapsum vteri completum, a reliquis
vulgo dictis vteri procidentis differentem,
simulque corporis humani ratio per anatomi-
cas exercitationes magis redderetur comper-
ta, siquidem constat, medicinam omnem præ-
primis, quae manu medetur, sine illa trun-
cam, debilem, minusque potentem esse. Me-

rebatur quoque exactam indagacionem, quo ostenderetur, vterum, quem matrem quidem dicimus, dum vices in alendo et conseruando gerit, quam diu in sinu foetum recondit, rectius tamen vocari, matrem plurimorum malorum. Secundum illud enim HIPPOCRATIS *faeminam bis pati morbum*, et DEMOCRITI *effatum epistola ad HIPPOCRATEM de natura humana*, constat vterum millenarum ærumnarum auctorem esse, quibus WEDELIVS *Exercit. Medic. Philos. Cent. I. Dec. I. Exerc. VIII.* addit, *vterum*, quem PLATO dixit animal furiosum, *centrum quoddam morborum constituere, ex quo omnes quasi lineæ ductæ illuc rursus e toto corpore confluerent.* Itaque liceat e præcipuis eorum momentis, neglectui a medicis datis potiora seligere, quæ beneuolæ C. L. subiicimus
censuræ.



De *uteri prolapsu* et *inversione* nec non *vaginae relaxatione* vtpote diuersis malæ conformationis et figuræ morbis, nobis acturis, necesse erit, præmittere veram harum procidentiarum descriptionem.

§. II.

Est autem *uteri prolapsus*, osculi et colli vteri, vel in sinum pudoris vel extra genitalia procidentia, *inversio*, descensus fundi vteri per orificium eius vel in sinum pudoris vel extra genitalia, *relaxatio* tandem vaginae, atonia tunicæ præprimis internæ rugosæ extra pudenda plus minus propendentis.

§. III.

Hi diuersæ indolis morbi in genere quidem nomine *uteri procidentiarum* (a) veniunt, adeo quidem, vt hoc

(a) WEDELIVS *ephem. germ.* et BARBETTE prolapsus vteri vocant hernias vterinas, quibus forsan latus huius vocabuli, significatus arridet, minime tamen his applicandus, cum non omnes herniæ sint species procidentiarum. Factum inde, vt per funestos vterorum ad inguina more herniarum decubitus in genere prolapsus intellexerint. conf.

TAVLLERVS *quæst. V.* Διασκηψεων Χειρουργικων. SENNERTVS *institut. Part. I. cap. II.* Germ. dicunt Einen Ausfall oder Zufall der Gebähr-Mütter, Mutterensenkung und Umstürzung derselben; Verschlapfung der Mutter-Scheide. Duas potissimum prolapsus species recenset MAURICEAV, libro, qui inscribitur *Traité des maladies des femmes grosses*.

hoc vocabulum differentibus his speciebus respondere et græcorum πρόπτωσις τῆς ὑτέρας (b) teste SENNERTO vaginæ relaxationem vterique prolapsum et inuersionem comprehendere dicatur; cum vero a se inuicem differant, (§. II. XVII. XVIII. XIX. XX.) sola hac procidentiae vterinae denominatione commode comprehendi nequeunt.

§. IV.

Diuiduntur procidentiarum vteri species vel in *completas* vel *incompletas*. Completa inuersio et *perfectus prolapsus* vteri dicuntur, si vel fundus per orificium vteri ductus, vel orificium vteri extra genitalium limites dilatatis labiis descendant; *imperfecta* audit vtraque species, si vel vterus inuersus vel orificium vteri prolabentis intra rimam magnam subsistant. Perfecta postea vocatur vaginæ relaxatio, si tota tunicæ vaginæ pars tam superior quam inferior extra pudenda prominet, *imperfecta* autem, si vel *anterior* pars vesicam vrinariam respiciens, vel posterior versus intestinum rectum directa plus minusve relaxata prolabitur, adeoque portio vna vaginæ priori opposita situm adhuc retinet naturalem. Præterea sunt vel *simplices* vel (c) *compositæ*, prout aliarum vicinarum partium simul concurrit prolapsus.

§. V.

grosses. Tom. I. Lib. III. cap. VI. pag. 390. seq. Priorem quem dicimus incompletum prolapsum, vocat *la descente ou relaxation de la matrice*. Sed vocabulo *la chute ou precipitation* significat prolapsum vteri completum et inuersionem eius, melius autem

distinguit species LA MOTTE *Traité complet des accouchemens naturelles nonnaturelles et contre nature. Lib. V. cap. XI. pag. 807.*

(b) Prax. Lib. IV. Part. I. Sect. II. cap. XV.

(c) vid. PEV *pratique des accouchemens Lib. II. p. 584.*

§. V.

Ad *possibilitatem et actualitatem* procidentiarum quod attinet, modus possibilitatis explicatur ex ipsa vteri structura, situ et connexione. Situs est vterus in hypogastrio seu pelvi, vesicam inter et intestinum rectum, tanquam inter duo pulvinaria, non eam tantum ob causam, vti GRAAFIVS (d) putat, quo *scilicet homines ex fragili et peritura materia inter stercus et urinam nati et in terram ac cinerem resoluendi, vilis et abiectæ suæ conditionis memores superbiæ alas demitterent*; sed sicuti ipse post modum consentit, præcipuam huius situs rationem commodum aptissimumque generationis locum respicere, cum pelvis non liberam solum concedit vtero expansionem, verum (e) ossibus, quibus constat, tanquam tutissimis

(d) *de mulierum organis generationi inferuentibus pag. 92.*

(e) An ossa pubis vel ilei inter parturiendum semper seiungantur? apertura pelvis in omni partu maxima fiat? ossa pubis deducantur? totalisque contingat ossis sacri retrocessio? non constat. Concedit quidem MANINGHAM *Compend. artis obstetric. separationem aliquam ossis sacri ab ossibus ilei, cuius articulatio ad mentem eius mobilis est; necessaria autem illa non semper esse videtur, cum vel facilis vel difficilis partus fundamentum non tam in pelvis magnitudine et apertu-*

ra, quam vteri potius situ rectilineo et obliquo quærendum conf. DN. D. PRAESIDIS *disquisitionem I. de situ vteri grauidi* MANINGHAM *Compend. citat. append. loc. addit.* Concurrit tamen ipsius pelvis apertura ad negotium partus, non quatenus a seiunctione ossium totali illa amplior redditur, sed quatenus a retrocessu ossis sacri quoad acumen seu os coccygis nonnunquam cavitas augetur, quæ natura prudenter fœminis prospiciente, initio iam maior fuit facta, quum 1) ossa pelvis tenuiora in sexu sequiori obseruentur, 2) notante celeb.

tissimis mœniis, partes internas nobilissimas contra externas defendit iniurias.

§. VI.

Licet autem vterus præprimis laterales eius partes, per ligamenta lata membranacea cum peritonæo continua, et ex eius vera lamina duplicata interueniente cellulosa seu externa spuria composita, pelvis parietibus iungantur, vterusque (f) rotundis ligamentis valde

HEISTERO angulus inter ossa ischii et pubis maior existat, et secundum GRAAFII *observationes* coxarum capacitas amplior sit viris. Interea non negamus in mala præsertim ossium conformatione vel nimia sæpius pelvis angustia fieri posse, ut ob insignem vteri expansionem præprimis autem motuum vim caput foetus in ossa pubis adigatur, et hanc ob causam in iunioribus ossa parum tantum nisi forsân sub violenta eiusmodi foetus mortui extractione plenaria contingat ruptura) a se inuicem diducantur. Sic Cel. MORGAGNVS ossium sæpius dilatandorum per cursum graviditatis dispositionem non vero maturi tantum partus momento productum euentum diiudicat, media et sicuti iudicat, tutissima via

cum SPIGELIO, SENNERTO, BARTHOLINO, VERHEYENIO, VESLINGIO, BLASIO, DE-VENTERIO, incedens, præprimis cum SANTORINVS *observat. anatomic. cap. XI.* sententiam HARVEI, DIEMERBROECKII, LVDOVICI, PARAEI, aliorumque contra MAVRICEAV, LAVRENTIVM HVBERTVM, LVDOVICVM MERCATVM et alios in contrariam abeuntes sententiam, fide ac auctoritate confirmet; nam *ossa pubis*, inquit, *in recenter denatis puerperis, quamvis non sæpius dirempta vidi, in aliquibus tamen ita diducta reperi, ut et nostrum et chirurgi, quitum aderat, facile fuerit pollicem transuersum indere.*

(f) De fibris ligamentorum lacertosis in puerperis et prægnantibus

valde elasticis, quæ a superiore fere vteri parte, exorta in pinguedine iuxta inguina et ossa pubis terminantur, naturaliter iusto æquilibrio seruetur, nec non pars anterior eius et inferior seu collum vaginæ cohæreat: fundus tamen vteri, qui a foetu et secundinis quidem expanditur, sed crassitie (g) non imminuitur, liber sui que iuris est et variis loci mutationibus nec non expansionibus et constrictionibus subeundis aptus. (h)

§. VII.

tibus conspicuis et de eorum structura conf. quæ passim apud REGNERVM DE GRAAF. *lib. cit. pag. 148.* et apud SANTORINVM *lib. cit. pag. 220.* occurrunt.

(g) vid. Dn. D. PRAESIDIS *disquis. supra citatam de situ vteri gravidæ etc.*

(h) Male motum quendam quasi voluntarium forsan ad DEMOCRITI mentem, qui vterum vocavit animal in animale ζῷον ἐν ζῷῳ ANDREAS LAVRENTIVS vtero concedit ventris regionem perambulantem. Hist. enim anatomic. Lib. VII. cap. XI. de usu vteri ligamentorum sequentia refert. *Horum vinculorum usus mirabilis est. Quum enim sæpe per totum ventrem aberret vterus, dum est infructuosus, nunc vel ad præcordia et hepar, ἡμωαλέειν fontem*

gratiosi vaporis recurrat, nunc per latera vagetur, nunc deorsum feratur, dum libidinis furiis agitur: debuit vinculorum opera huius motus tanquam freno coerceri etc. Melius rectiusque inter alios explicuit facultatem variæ mutationis localis vteri REGN. DE GRAAF. quando *lib. cit. pag. 92.* Non semper, inquit, in medio præcise collocatur vterus, sed quandoque licet rarius, illum nunc magis versus dextram nunc magis versus sinistram hypogastrii partem situm offendimus, quod præsertim in pregnantibus ab aliis anatomicis notatum inuenimus, deinde pag. 102. vterum in gravidis ita amplificari tradit, ut, qui ante imprægnationem ossis sacri initium non supergreditur, fundus eius postea ad umbilicum et ulterius extendatur, ac totam pel-

vim

§. VII.

Præter vteri expansionem in grauidis vltimo gestationis mense, noua quædam contingit situs mutatio ratione specificæ grauitatis, qua vterus grauidus tendit versus vaginæ orificium. Vocant illam *vteri descensum*, germanice *Der Leib hat sich gesencket*, variis, in infima hypogastrii parte stipatum incommodis. (i) Plurimi recentiorum eum, vel cum fictitia (k) foetus versione, quæ octauo mense vel initio noni fieri dicitur, confundunt, vel ab hoc figmento originem huius descensus deducunt.

§. VIII.

vim non solum adimpleat; verum etiam intestina tenuia et reliqua viscera sursum comprimat. cf. quoque DEVENTERIVS, qui *Operat. Chirurgic. Obstetricibus nouum lumen exhibentibus c. IX.* hac de re fusius egit.

(i) Cum vterus ratione variarum mutationum, quibus obnoxius est, pristinum non semper retineat locum; mirandum non est, qui fiat, vt vtero toto pondere regioni pubis et vesicæ vrinariæ incumbente, grvida vel ad mingendum sæpius frequentiusque exci-
retur, vel vrinæ excretio plane supprimatur; compresso vero a mole intestino recto alius nimis adstricta reddatur, immo a compressis vasis maioribus et impeditum liberum sanguinis per venas

regressum tumor pedum oriatur œdematosus. Vid. DEVENTER. *l. c.* p. 59. Symptomatum periculosa alex plenorum retentionem vrinæ comitantium mentionem faciunt MEMOIRES de L' academ. Royal. des sciences 1708. KOCH de *affect. vesic. rariss.* expansionis vltra gradum vesicæ EDIMB. Soc. IV. pag. 449. mortis ex retentione vrinæ. CHAPMAN *improv. of Midwifery. Case 40*, ischuriæ a vesica compressa. EPHEM. NAT. CVR. Dec. VI. obs. 126.

(k) Impossibilitatem dictæ versionis variis ex rationibus sufficientibus demonstrat Dom. D. PRAESES in *præf. ad Compend. R. Manningham. et adiuncta ipsi disquis. I. cit.*

§. VIII.

Ab hoc vteri descensu, qui instante partus negotio vi motuum ad exclusionem foetus secundinarumque directorum æquali vi naturaliter et ulterius promouetur, rugosæ alias vaginæ longitudo ita mutatur, vt canalisis in statu extra grauiditatem septem vel octo digitos referens, tempore partus, ruptis membranis et orificio vteri satis dilatato, nec non capite foetus versus pudenda tendente, iusto breuior fiat, orificia autem vteri et vaginæ communem quasi ductum pro transitu foetus facilitando constituere videantur.

§. IX

Sicuti igitur hoc respectu orificium vteri partus tempore semper versus vaginæ os premitur, ita relaxatis nimis partibus ac continuo in partu maxime difficili nixu, nisi cito miseris parturientibus succurratur auxilio et consilio, ante foetus exclusionem propelli aut vi ab imperitis obstetricibus extrahi solet. Cuius rei varios tristes euentus, additis præcauendi scopo cautelis quibusdam practicis passim relatos legimus. (1)

§. X.

Hic naturalis itaque vteri descensus *morbosi possibilitatem* indicat, virorum vero clarissimorum auctoritas et

(1) vid. DIONIS *traité general des accouchemens* cap. XIII. pag. 266. MAVRICEAV *lib. cit.* pag. 398. DEVENTER. *operat.*

chirurg. cap. XIX. pag. 130. MAN-
NINGHAM *l. c. pag. 61.* MÜN-
NICK *chirurg. lib. I. cap. XXXIII.*

et obseruationes quamplurimæ, eiusdem *actualitatem* (m) confirmant. Mirandum igitur nonnullos (n) veritatem facti denegasse, præprimis autem KERCKRINGIVM (o) eos, qui vterum foras prodire et extra corpus propendere existimarunt, cultro anatomico impugnasse, cum tamen nec cultelli acies acuta satis, nec strenui descensus vterini impugnatoris diiudicandi ratio exquisita denegandæ veritati luce meridiana clariori suffecerint.

§. XI.

Infirmis enim fundamentis nititur eius demonstratio. Concedimus quidem sarcomata aut alias vaginæ excrescentias foras propendentes cum vteri procidentibus confundi posse, præprimis cum citat. vir de simili fungosa substantia, quam in puella obseruauit, refert,

- (m) Conf. FELIX PLATERVS *pag. 211. PEN lib. cit. cap. XXI.*
in observ. Lib. III. Dom. de MAR-
CHETTIS anat. Cap. VII. IAC-
COB. PRIMEROSIVS de morb.
mulier. Lib. II. cap. XV. VESLIN-
GIVS Syntagmat. anat. cap. VII.
BARTHOLINVS Anat. reformat.
Lib. I. Cap. XXVIII. PEIERVS
E. G. Dec. II. ann. I. obs. 14. 84.
91. 94. SALMVTH. Obs. Cent. I.
LXXVII. RVYSCHIVS obs. anat.
chirurg. VOELTER. schola obstet-
ric. pag. 158. MAVRICEAV,
LA MOTTE, DEVENTER. loc.
cit. VIARDEL observ. sur la pra-
tique des accouchemens Cap. XXX.
- (n) ETMVLLERVS, BAR-
 BETTE, DECKERVS, HOR-
 NIVS alii prolapsum vteri nun-
 quam aut rarissime nec nisi a caus-
 sa tantum externa violenta acci-
 dere affirmant.
- (o) *Observ. anatom. XX. pag.*
49. et obs. LIII. pag. 113.

refert, se inuenisse *sarcomatis rudimentum instar dactyli*, orificio vteri interno adhærescens, quod si tempore adauctum fuisset, eadem ratione incautis chirurgis vel medicis imposuisset, qui uterum semper immobiliter loco suo consistentem tanquam vagantem per omnes partes ventris cum LAVRENTIO, vel tanquam procidentem cum plerisque aliis indicassent: ab ignorantia tamen nonnullorum ad negationem rei non valet consequentia, siquidem ipsa ratio dictat, fungosas excrescentias (p) ab vteri procidentibus vtpote diuersis affectibus, distingui posse. Hinc neque his nec aliis ab arcta vteri cum vicinis partibus cohæsione, vel ipsa vteri grauidi substantia deductis rationibus calculum nostrum apponimus, sed vteri partes omnes elasticas, variis mutationibus, constrictioni, relaxationi et rupturæ, (q) obnoxias esse affirmamus.

§. XII.

(p) *Excrescentia fungosa vterum prolapsum simulans* describitur *miscellan. N. C. Dec. I. ann. II. obs. 121.* item inuersus vterus carneis excrescentis plurimis obfitus *Miscell. N. C. Dec. II. an. I. obs. 186.* RVYSCHIVS *excrescentias vterinas*, quas *polypos vteri* quoque dicunt, sæpissime observauit, interim bene distinguit ab vteri prolapsu et inuersione *conf. obs. LVIII. pag. 54. sqq.*

(q) De vtero toto extra vulvam ita prolapso, vt illum exstirpandi necessitas postulauerit, memorabilia quidem referunt exem-

pla PAVLVS AEGINETA, PAREVS, MERCVRIALIS, FERNELIVS, SENNERTVS, LANGIVS, BONETVS; sed, sit alias fides penes auctores, quæritur iam dum de veritate facti valde dubitamus, an hæc vteri exstirpatio, quam sine vitæ discrimine factam fuisse affirmant, non potius pro vaginæ prolapsæ abscissione sit habenda? (§. XIV. XV.) præprimis si triste illud exemplum et crudele institutum nobis in mentem incidit, cuius RVYSCHIVS meminit *obs. annat. medic. chirurgic. obs. VII. p. X.*

§. XII.

Itaque, stabilita veritate prolapsus vteri, nos accingimus ad considerationem *inuerſionis* quatenus vel fieri potest vel vere contingit. *Possibilitatem* eius euincimus ex libera fundi vteri expansione, (r) ligamentorum relaxatione, et violenta placentæ vtero præternaturaliter adhærentis (s) extractione. Si itaque verum, collum et latera vteri, excepto fundo cohærere partibus adiacentibus, sequitur illa vi cuidam magis resistere posse, fundo vteri, qui, facta post foetus exclusionem funiculi vmbilicalis violenta extractione in consortium abripitur, et, nisi contingat ruptura funiculi, per apertum satis vteri orificium vna cum secundinis ducitur.

§. XIII.

Quamuis autem non negandum, alteram hanc vterinæ procidentiae speciem seu inuerſionem, sub qua fundus

(r) Vterus post foetus exclusionem sæpiſſime inæqualiter vel expansus vel constrictusprehenditur. Obseruatur id quam maxime in partibus præternaturalibus, in quibus peracta operatione auctores manum rursus vtero immittere iubent, quo sanguis in illo adhuc contentus euacuetur, et obseruetur, num vterus æqualiter expansus sese circa manum constringat? DEVENTER igitur, VANHORN, CHAPMAN, GIFFART, Dn. D. PRAESES, facta sanguinis euacuatione, dorso ma-

nus caute vteri fornicem restituant et quasuis occurrentes plicas adaquant, quo æqualis contingat vteri constrictio, dolores post partum vehementes imminuantur, vterique inflammatio, ob vasa compressa, quantum fieri potest, impediatur. (§. XXXI.)

(s) RVYSCHIVS *aduersariis anat. num. X. contingit*, inquit, *placentam fundo matricis cauo, conuexitate sui corporis adeo accretam adhærescere, vt in vnum fere corpus miris coaluisse modis visum fuerit.*

dus vteri instar chirothecæ vel marsupii inuertitur et per
 orificium vteri protrahitur, priori rariorem esse mor-
 bum externum; de eius tamen possibilitate non est, quod
 dubitemus, præprimis cum accedant virorum (t) fide
 digno-

(t) Eiusmodi obseruationes
 vid. apud TH. BARTHOLINVM
*Hist. anat. cent. II. hist. 91. RUY-
 SCHIUM observ. anatom. chirurg.
 Cent. I. obs. X. Conf. quoque PETR.
 MARCHETTIS observat. LXI.
 STALPART: van der WIEL
 observ. LXVII. HILDANVS
 Cent. IV. obs. LX. ISBRAND.
 DIEMERBROECK. anatom. Lib.
 I. cap. XV. MAVRICEAV Lib.
 cit. cap. V. pag. 390. GERH. BLA-
 SIVS observat. anat. pag. 128. LA
 MOTTE lib. cit. pag. 806. AM-
 MAND lib. cit. obs. LX. pag. 160.
 et obs. LXII. pag. 214. PEV Lib.
 cit. pag. 585. Inter alios autem
 CHAPMAN Lib. cit. cas. XXIX.
 pag. 123. tristem refert observatio-
 nem, quæ, quum evidens igno-
 rantia plurimarum obstetricum
 exhibeat testimonium, (siquidem
 ab earum peruerso operandi mo-
 do, vti antea iam dictum, acci-
 dit vt plurimum vteri inuersio,)
 illam pagellis nostris inferere di-
 gnam iudicauimus.*

CASE XXIX.

A Woman killed
 by an Inversion of the uterus.
*I was, in the greatest Haste, sent
 for to a Woman Six miles distant
 from me; to whom I went with
 all possible Speed, but found on my
 Arrival, that she had been dead,
 near half an Hour. I conjectured
 she had died by flading; but,
 upon asking the Question, was
 answered in the Negative. The
 Midwife told me, that the After-
 Birth stuck so fast in one Part,
 that she was not able with all her
 Strength to take it from her, though
 she had gained most of it. Upon
 this I desired the favour of seeing
 the Corps, which being granted,
 I found, to my great Surprise,
 that the Uterus was inverted, and
 entirely out of the Body, hanging
 down between the Thighs, with
 the Placenta adhering to its Fun-
 dus, which I separated before the
 Midwife, and several Matrons the-
 re present, and convinced them
 all*

dignorum auctoritas et observationes, vtpote qui ea, quæ ad historiam, causæ cognitionem, curandi et præservandi modum pertinent, fideliter tradunt.

§. XIV.

Tertia procidentia species, *vaginae* scilicet *relaxatio*, non ab omnibus auctoribus ab vteri prolapsu rite fuit distincta, (u) sed pro eadem sæpissime habita: aliam autem esse huius rationem, aliumque fiendi modum, tam ex vaginae structura quam partium differentia optime diiudicamus. Præter differentiam enim satis notam constat, vaginam variis tunicis, musculosa, glanduloso-neruea, cellulosa, et interna plus minus rugosa instructam esse, hinc facillime, sicuti fit in ani procidentia relaxatis fibris muscularibus, vel in aliquibus vaginae locis, (x) vel in toto eius ambitu procidentiam oriri posse.

§. XV.

all of the dismal Accident. This Woman, it seems, had a very good and easy delivery of the Child; but that born, the Midwife pulled hard at the String, and so brought down the Uterus, which as soon as she could take any hold of she did: And then pulling with fresh violence, and not being deterred by the loudest Cries, the poor miserable Woman in a few minutes fell into strong Convulsions and Delirium, and so expired. Thus

was a young healthy mother cut off in the Bloom of Life and cast into the cold Arms of Death, just as she was about to clasp her first-born in her own.

(u) conf. DAVID van der BEECK. in peculiari diff. de vteri procidentia.

(x) Duplex procidentia diuersis in locis duos renes vitulinos referens describitur a WEPFFERO Eph. Germ. Dec. II. ann. V. obs. 150.

§. XV.

Interim eiusmodi relaxationem sæpius cum vteri prolapsu coniunctam esse et extra pudenda propendentem vterum verum mentiri, variæ auctorum testantur observationes. (y)

§. XVI.

Quæ itaque inter tres species intercedat differentia, ex prioribus patet, simulque cognoscitur, *vteri prolapsum et vaginæ relaxationem*, siue completa siue incompleta sint, tam in virginibus quam mulieribus *extra statum graviditatis et post partum* contingere, *inversionem* autem vteri post *exclusionem fœtus* aperto satis orificio vteri a violenta qualicunque causa externa et ipsi iuncta vi interna tantum fieri posse.

§. XVII.

Ab hac differentia ducimur ad diiudicanda signa *triplicis procidentiae diagnostica*. In completa et incompleta vteri inversione, quæ visu tactuque explorari poterunt, ob-
serva-

(y) RVYSCHIVS in muliere annosa molem propendentem, quæ secum rapuit portionem vesicæ, a se observatam, describit *Observ. anat. chirurg.* vid. quoque MEECKERN *observ. med. chirurg. c. LIV. Misc. N. C.* Dec. II. an. X, obs. 181. Dec. III.

ann. V et VI. obs. 226. Eph. germ. Dec. II. ann. I. obs. 84. Dec. II. ann. IX. obs. 149. PEV l. c. MAVRICEAV l. c. pag. 397. LA MOTTE l. c. cap. XI. pag. 807. DE VENTER l. c. MESNARD l. c. artic. II. pag. 40.

seruamus, placentam ope funiculi quidem extractam, sed fundo vteri eiusque substantiæ adhærentem, et aditum in eius cauitatem occludentem. Placenta ab vtero inuerso separata excitat insignem hæmorrhagiam propter vascula eminentia aperta, quæ optime delineauit R V YSCHIVS et aliquoties mercurio viuo iniecta inter præparata Excell. Dn. D. PRAESIDIS conspiciere mihi licuit. Figuram habet pyri magni inuersi, cuius circumferentia maxima circa vaginæ orificium offenditur, pars vero fundi vteri per eius orificium descendens pediculum refert, illudque ita occludit, vt plane euanescat et circulo tantum mucilaginoso albicante obductum cernatur.

§. XVIII.

Huncce statum vteri præternaturalem comitantur dolores maximi præprimis in regionibus lumbaribus et circa genitalia, tumores partium inflammatorii, ischuria, alui constipatio; fluxus lochialis suppressio, pulsus celer et durus, præcordiorum anxietates, prostratio virium, animi deliquia, et reliqua iunctæ febri inflammatoriæ signa.

§. XIX.

Prolapsus vteri completus et incompletus ratione mutatae vteri figuræ eiusque orificii a priori specie tam oculorum acie, quam tactu optime distinguendus est. Reliqua huic affectui familiaria symptomata sunt præprimis dolores tensui in regionibus lumborum, ossis sacri
et

et hypogastrii, pondus pro ratione prolapsus intra genitalia maximum, motum corporis diversimode impediens. Uterus in vaginæ cavitationem irrepens, et instar cunei inter duo receptacula excrementorum hærens ea valde comprimit. Percipitur simul ardor (z) in genitalibus, et excoriatio vtero ab urinae effluxu inducitur. Accedente vero inflammatione partium, signa §. XVIII. indicata, concurrunt.

§. XX.

In relaxatione autem vaginæ conspicimus membranam internam vel quaquaversum, vel in certa tantum parte e genitalibus propendentem, rugas vaginæ minores attritas & prorsus oblitteratas. Quo magis autem extra genitalia prodit, eo magis attenuatur interna superficies, excoriatio partium et dolores sub emissionem urinae contingunt. Si procidentia hæc juncta sit cum uteri prolapsu, simul ipsi respondent signa antecedenti paragrapho exposita.

§. XXI.

A signis progredimur ad *causarum* cognitionem, sub qua-

(z) HIPPOCRATES *de morb. mulier. Lib. II. Sect. V. num. 30. p. 655.* Si uteri extra naturam processerint, pudendum et inum ventrem igneus calor de-

tinet, urina crebro sensimque stillat pudendumque vehementer mordetur. Hoc autem accidit, ubi recenter a partu cum viro dormierit.

quarum scrutinio respicimus tam ad *antecedentes* quam *proximas*. Accusamus placentæ ad fundum uteri nimis relaxatum præternaturalem accretionem utpote causam remotam *inversionis*. Quid enim valeat ejusmodi situs placentæ et adhæsiō in producendis diversis symptomatibus, docuit inter alios præclare STUARTVS *dissert. de Secundinis nocivis* æque ac salutiferis. Mirum inde non est, accedentibus aliis v. g. laborioso partu, nisu foetum excludendi validiori, excluso foetu excrementa excernendi fortiori conatu, violenta (aa) funiculi vmbilicalis

(aa) REGNERVS DE GRAAF. L. c. p. 146. *Quantum ad nos attinget, inquit, existimamus, in difficili partu, dum placenta utero firmiter adheret, et ab imperitis obstetricibus nimium attrahitur, inuersionem aliquando contingere posse, rarissime licet eveniat; et RVYSCHIVS L. c. Oritur hoc malum nonnunquam ab obstetricibus minus expertis funiculum vmbilicalem plusquam par est attrahentibus, unde uterus non potest non subsequi. Illustr. quoque HALLERVS de duplici vteri prolapsus specie in pathologia generali et prælect. ad BOERHAAV. instit. med. pag. 58. erudite ita sentit: Uterus dum detrahitur simul inuertitur, quando obstetrix placentam fortius vel-*

lendo extraxit, neque altera manu uterum sustinuit; tunc enim si chorion utero, firmiter adhæserit, poterit cum extracta placenta uterus deorsum educi; si tunc quam maxime uterus repositus fuerit, perpetua tamen ad prolapsum dispositio superest. Huius rei in gratiam G. BLASII observationes medicæ rariores p. 42 seq. conferantur, præprimis autem ea, quam part. III. obs. II. refert, notentur. Ibi enim: Aperui ventrem defunctæ puerperæ. Obierat hac die præcedente hora quinta post partum, sana alias antea, edito foetu optime valente. Exhibuit se hic vteri fundus ad interiora illius conversus, sicque ad pudendum usque prolapsus, adeo ut vagina tota corpore hoc
uteri

lialis attractione, cujus vifundus resistere nesciens, celeritatem et directionem sequitur, facillime accidere ejusmodi malum (bb).

§. XXII.

uteri inverso repleretur, quod etiam arcte adeo a contracto utero detinebatur, ut non nisi robore summo, atque violentia, ope per pudendum immissi instrumenti, sursum detrudi, sicque in naturalem locum reduci potuerit. Imprudentiæ obstetricis, an vero nimis arctæ coherentiæ secundinarum cum uteri membrana interna, hoc malum adscribi debeat, non meum determinare, hoc tamen addo, retulisse adstantes mulieres, quæ in partu obstetrici auxiliares fuerant, quam primum fœtus in lucem prodisset, exclamasse obstetricem adhuc alium in utero hære fœtum, sicque extra pudendum protraxisse corpus aliquod rubrum, ad cujus adspæctum consternatæ adsidentes, imperitiæ illam accusarunt, ab opere desisteret serio admonentes, quod etiam fecit, postquam, in quantum vel per uteri contractionem vel per ignorantiam, licuit, extra pudendum dependens, introrsum iterum compulit. Vasa omnia sanguine hic adeo destituebantur, ut

etiam quocunque loco cultro Anatomico aperta nil ejus funderent, subsidentibus in totum tunicis; quem etiam sanguinis defectum ex immoderato fluxu, ob secundinæ violentam separationem extractionemque causatum, mortis subitanæ causam iudicamus. conf. §. XIII. not. c.

(bb) Tradunt nonnulli; se aliquot dies post partum contingentem eiusmodi inuersionem ab induratis scybalis et vehementi alvum excernendi pressione, observasse, vasaque fundi uteri per orificium uteri hiantia constricta et mucilaginosi punctis non vero sanguineis tincta inuenisse; an vero a sola pressionis vi eiusmodi inuersio uteri contingere possit? valde dubito, incompletam autem fuisse antea iam inuersionem malumque a voluntario motu violento auctum et inuersionem completam redditam, ex supra adductis rationibus potius diiudicari licet. Caterum conf. RVYSCHII *obs. X. pag. 12.*

§. XXII.

Causæ prolapsus uteri variæ sunt. Motus enim violenti diversæ species, sicuti hernias ita quoque vteri procidentias producere valent in phlegmaticis maxime, ad cachexiam pronis, colluvie serosa abundantibus, vt et in illis, quæ ex recenti puerperio viribus adhuc imbecilibus, partibusque utero continuis nimis relaxatis (cc), gaudent. Harum autem in numerum referri solent vehementes tusses, clamores, extensiones violentæ artuum, labores duriores, tenesmi, contusiones graves, lapsus, saltationes, equitationes, violentæ sternutationes, ponderum sublevationes, vomitus, desaltationes ex alto divaricatis cruribus, aereque retento, & quæ sunt reliqua, quæ contra sententiam ROONHVYSII procidentias producere, & mala inveterata reddere possunt deteriora (dd).

§. XXIII.

(cc) HIPPOCRAT. *de morb. mulier: Lib. II. Sect. V. num. 40.* Qualibet, inquit, occasio ad commouendos uteros satis est, si quid vitii habeant. Id enim vel ex pedum et lumborum frigore contingit, et ex saltatione, animi consternatione, lignorum sectione, cursu ad acclivem vel declivem locum et ex aliis plurimis.

(dd) Illustr. HALLERVS

præclare l. c. doce, thunc morbum frequentem esse, et oriri sæpe, quando continuo a partu mulier, nimis sana, nixum edit, aut ambulat, quod inter pauperculas rusticas mulieres frequenter fieri solet: tunc enim omnia circa uterum aperta et laxa sunt, qua puer nuper transiit, et uterus facile extrorsum decumbit.

§. XXIII.

Enarratis iam causis, aliæ annumerari merentur vel *a vi partus* vel *a nimia humiditate* deductæ. Sub partu enim laborioso caput foetus sæpius una cum orificio uteri, nisi illud digitis lateraliter retineatur, extra pudenda propellitur (ee); accedentibus autem adhuc post partum ejusmodi conatibus & pressione vi, mirum non est, effectus relaxati nec in pristinum statum restituti uteri subsequi. Deinde quod nimiam attinet humiditatem ipsa ratio docet humores a toto corpore fluentes, ligamenta vteri humectare ac relaxare posse, simulque experientia confirmat in locis humidioribus hunc morbum satis familiarem esse. His itaque ductus rationibus recte judicat GRAAFIUS, (ff) prolapsum vteri in virginibus posse contingere. *Meminimus enim, inquit, nos uno tempore ad quatuor diversas filias, quarum virginitas innoxia habebatur, vocatos fuisse, quæ uteri prolapsu laborabant, quibus partim fomentis adstringentibus, partim annuli cerei in pudenda immisione, non vulgare attulimus auxilium.* Hinc facile diiudicandum, cur abusum balneorum et vnguentorum emollientium, ipsumque fluorem album (gg) inter causas retulerint auctores, quæ

(ee) *Etsi fœtus situm rectilinum retineat, inter labores tamen parturienti, sine magno conatu, contingere posse vteri eiusque vaginæ procidentiam, si scilicet pelvis nimis ampla fuerit ad proportionem vteri, et quid in illo con-*

tinetur, si insuper os vteri crassum sit et durum, ipsaque muliebria laxa facile dilatentur; testatur DEVENTER. l.c. p. 79.

(ff) *L. c. p. 153.*

(gg) *Conf. hist. præfamine huius dissert. descriptam. Ob-*
D fer-

quæ prolapsum vteri excitare valent, et quomodo fiat, ut humores in rugis et plicis vaginæ adhuc subsistentes mora acrimoniam induant partesque arrodant.

§. XXIV.

Cognitis hisce *proximam* eruimus, quam ligamentorum, præprimis vteri rotundorum, vel relaxationem (hh) vel violentam avulsionem et abruptionem (ii) esse arbitramur. Non vero plenariam hic ab vtero, vel parte, cui infiguntur ligamenta, intelligimus avulsionem, sed, ut MAURICEAU iudicat, incipientem fibrarum quarundam separationem, qua ligamentorum longitudo augetur, eorum autem renisus et vis elastica immittitur.

§. XXV.

seruauit Dn. D. Præses aliquoties, peractam modo infra explicando, prolapsus vteri repositionem, excepisse fluoris albi antea suppressi, excretionem, materiamque mucilaginoso - glutinosam albicantem e genitalibus profluxisse, quæ a glandulis, a nimio humorum ad inferiora affluxu, obstructis et relaxatis originem duxit et specialissimam postea postulavit medendi methodum. Similiter IACOB. SYLVIVS *Ligamenta vteri laxari demonstrat aut humore multo præsertim pituitoso* (vterus enim velut quadam

mulieri est cloaca) imbuta, aut partu crebro, vel alia ex causa, ut ætatis declinantis imbecillitate exsoluta aut paralyti affecta etc.

(hh) IACOB. SYLVIVS *Lib. cit.* ostendit causam mali huius continentem esse *membranarum, quæ vterum vicinis partibus connectunt, abruptionem vel laxationem.*

(ii) Præter ea, quæ de crudeli vteri protractione litteris dederunt, BARBETTE, BLEGNY, MAURICEAU, conf. *Eph. Germ. dec. II. an. I. obs. XIV. et LXXXIV.*

§. XXV.

Sequitur iam ordine indagatio *causarum relaxationis vaginae*. Inter *remotas* referimus statum ad cachexiam pronum, habitum (kk) tam totius corporis quam partium quarundam rariorem, molliorem, peculiaremque genitalium dispositionem, temperamentum sanguineum et phlegmaticum. Inter *efficientes* vero, humores serofos in libidinosis maxime, coitu sæpius vtentibus, ad genitalia loca confluentes, prægressum fluorem album, quo vel arrosio vel relaxatio tunicæ internæ vaginalis facta, foetum ægrius per vaginam expulsum, et vel obviarum angustiam, vel vteri, vel situs foetus in vtero obliquitatem immobiliter ibi coarctatum, parturiendi et egerendi aluum nisum validiorem, sub quo vagina ita inuerti potest, vt internus paries exterior quasi fiat, sicuti inuersio intestini recti in equis aluum exonerantibus manifesta est. Quibus tandem addimus quascunque sub difficili partus labore ab auxiliatrice obstetricis manu, vaginae inductas violentias.

D 2

§. XXVI.

(kk) LVDovic. MERCAT. de affect. mul. Cap. de vteri pro-
cident. Hoc vitium senibus subin-
de magnis accidit, et iis, quæ ex
instituto vitæ (quales sunt lotrices
mulierculæ) nudos diu in frigida
pedes continent, aut in frigido la-
pide diutius sedent, vel aerem fri-
gidiorum excipiunt, maxime in
puerperio, aut menstruo fluente,

quod eo tempore vteri utraque pars
magis hiet. Libro quoque ERO-
TIS seu TROTVLAE curandarum
agritudinum muliebrium, qui pri-
mum editus fuit inter medicos ve-
teres latinos Aldinos Venetiis 1547.
Folio, simul de matricis descensu,
propter neruorum remollitionem,
et frigidorum humorum abundan-
tiam contingente, agitur.

§. XXVI.

Cum igitur omnia, quæ tunicam vaginæ internam durius premunt, tonumque glandularum et fibrarum valde labefactant, eiusmodi morbum externum producere valent, apparet causam proximam eius, remissionem fibrarum vaginæ vel totalem vel partialem esse, qua non rugæ solum oblitterantur, verum vagina extensa nimis, prolabitur, et globosam induens figuram vterum verum sæpissime mentitur. (§. XV.)

§. XXVII.

De prognosi harum procidentiarum vt quædam moneamus, notandum, *inversionis vteri* dubiam et funestam vtplurimum esse, diiudicandam autem a tempore durationis, et comitantibus eam symptomatibus. (§. XVII. et XVIII.) Quo brevius enim fuit tempus, contingentis *incompletæ* vteri inversionis, eo mitiora quoque symptomata et eo facilior curatio. Quo diutius autem *completa* puerperam afflixit, eo difficilior et impossibilis fere repositio, cum lethalia hæmorrhagiæ, inflammationis, gangrænæ, sphaceli et plenariæ corruptionis, illam comitentur symptomata. Testatur enim RVYSCHIVS, (II) affectum hunc, nisi illico profligetur, mortem statim subsequi. Memini, ait, me bis vna in septimana hoc vidisse, nec (nisi absque vlla mora opem ferret obstetrix) ullam, præter uxorem cuiusdam Ebræi, euasisse.

§. XXVIII.

(II) Operib. anat. chirurg. musculo in fundo vteri reperto
obs. X. p. 12. et tractat. anatom. de p. 18.

§. XXVIII.

Quid de *prolapsu vteri eiusque vaginae relaxatione* sit sentiendum, ex tradita supra horum morborum natura perspicitur. Quamuis enim inflammationes et corruptiones iisdem accidisse, sæpius visum fuerit, interim sibi relictæ nec incongruis externis tractatæ, raro lethales euadunt, sed variis tantum stipatæ sunt incommodis. Collegit nonnullas observationes Dn. D. PRAESES, ex quibus didici, fœminam ultra decem et plures adhuc annos prolapsu vteri incompleto, completo postea facto, ne dicam procidentia vaginae, utpote leuiori prolapsus specie laborasse, resque domesticas, exceptis tantum quibusdam corporis motibus, (§. XXII.) peragere potuisse.

§. XXIX.

Cum igitur saluam posse ad tempus subsistere vitam, neglecta etiam harum procidentiarum curatione, (§. XXVIII.) demonstrauius, quæritur iure, quænam *prognosis ratione curationis* in genere formanda sit? Hanc vero dubiam esse respondemus, cum respectus habendus sit ad ipsum individuum, genitalium dispositionem, ætatis rationem, et procidentiarum condiciones. In illis enim, in quibus præsertim vteri prolapsus malum fuit inueteratum (mm) vterusque sphæricam magnam molem

(mm) IACOB. SYLVIVS lib. cit. Recens, inquit, vteri procidentia, si reponatur, etas sit adulescens aut florens, hæret et permanet, ægre tamen si veterauit (quan-

do nec dolet nec conuelli periclitatur) reponi quidem potest; sed mox leui ex causa relabitur præsertim ætate iam prouectiore.

molem refert, difficulter erit reponendus et in situ naturali retinendus, repositio tamen non semper est impossibilis, præprimis si secundum leges certas, inferius præscribendas, circumspecte et caute instituatur. Recens autem perfectus et imperfectus vteri descensus, si convenienter tractetur, spem felicitis curationis promittit, sicuti et relaxatio vaginæ more methodicorum citra instrumentorum quorundam auxilium, externo remedium vfu corrigi potest.

§. XXX.

Accedimus iam ad *curationem*, quæ differt pro ratione diuersitatis procidentiarum. Alium enim postulat tractandi modum inuersio vterina quam prolapsus, alium rursus relaxatio vaginæ quam prolapsus et inuersio vteri. Generalis autem indicatio eo redit, quo vterus, qui inuersus prodiit, in naturalem reponatur situm ibique retineatur, superficies vteri interna vndique æqualis reddatur, et partes nimis relaxatæ simul roborentur.

§. XXXI.

Repositio autem inuersi vteri sine mora (nn) ita instituenda est. Vt (siue completa siue incompleta inuersio sit) capite

(nn) De vteri a partu inuersione ab imperita manu lethali reddita RVYSCHIVS *oper. anat. med. chirurg. obs. XXVI.* vbi:

nisi cito auxilio succurratur inuersioni vteri, *funesta fit.* Legat. LA MOTTE *lib. cit. pag. 806.*

capite puerperæ decliui posito, dorsoque eleuato, retractis ad nates calcibus, pars vteri prominens et perinæo incumbens, digitis manus dextræ, successiue et circumspecte in vaginam reponatur: postea fundus per orificium ductus leniter reprimatur, et, ne ob atoniam vteri inuersio recurrat, dorso manus in vteri cauitatem immissæ, naturalis fundi figura, vterique fornix restituitur, quæuis ibi occurrentes plicæ et sulci, adæquentur, tandem manus in pugnum mutata, leniter extrahatur, antea vero paulatim ibi detineatur explorandi causa vtrum correctam hanc vteri inuersionem, sequatur eiusdem constrictio? quippe quæ spem facit reconualescentiæ.

§. XXXII.

Quodsi vero plures horæ a tempore inceptæ inuersionis præterlapsæ iam fuerint (§. XXVII.) et grauiora inflammationis, tumorisque adsint symptomata, pars quasi prominens indurata, per conuenientia externe applicata medicamenta aliquatenus emolliatur, sicque fundus peragendæ repositioni aptus reddatur, alius autem per clysterem oleosum carminatiuum blande ducatur et lotium ope cateteris euacuetur.

§. XXXIII.

Partes itaque prominentes *emolliantur* prius lacte tepido, cui spongia immergenda et ope illius externa genitalia fouenda, omnis autem impuritas circa ambitum orificii, per quod vteri fundus prodiit, detergenda.
In

In casu difficiliore decocta emollientium et carminatiuarum herbarum, ex farin. fabar. furf. trit. flor. malv. alth. meliss. chamomill. r. et v. sambuc. sem. carui, foenicul. lini, in forma cataplasmatismis ope lintheaminum quadrupliciorum, genitalibus tepide applicentur, quo tumor minor et plicabilis fiat, vterique fundus eo facilius reponi possit.

§. XXXIV.

Peracta *repositione*, (§. XXXI.) sub qua sibilum quendam, sicuti in herniarum repositione observabis, quies tam corporis quam animi miseris commendanda. Præprimis autem per plures dies puerpera in situ reclinato iaceat immota, extensis cruribus et ita coaptatis, ut alterum alteri incumbat, animi pathemata, occasiones ridendi, loquendi, clamandi, tussendi, vomendique etc. fugiat, vrinam autem vel aluum in eiusmodi situ declivi, nulla adhibita vi pressiois, commode excernat, et huius rei ob causam quotidie vtatur enemate ex lacte confecto, vel alio quodam ex speciebus emollientibus cum auena excorticata in aqua coctis parato, addito quantum satis olei chamom. coct. Externæ partes contra inflammationem et putrefactionem defendantur, specificis quibusdam, v. g. herba Saluæ in vino cocta cum sufficiente quantitate butyri infalsi remixta, et aqua vulneraria vel sola vel cum aqua calcis viuæ, ope spongiæ aut lintheaminum, tepide ipsis impositis, abdomen vero oleo rosar. inungatur, aut si opus est, species resoluentes et discutientes in vino coctæ in usum trahantur.

§. XXXV.

§. XXXV.

Hæc quidem quoad *externa* remedia initio sufficiant; cum statim post applicationem eorum medentis intentio dirigenda sit ad statum corporis internum, lochialem fluxum et iunctam ipsi utplurimum febrem. Hinc curatio indicationibus innititur sequentibus. Status nimirum inflammatorius incipiens discutiendus, purgatio vterina et reliquæ excretiones blande promouendæ, motus internus auctior contemperandus, et tandem partibus tam internis quam externis tonus restituendus.

§. XXXVI.

Si igitur facta repositione vteri, fluxus lochialis non succedat, sed periculum *inflammationis* immineat, aut ipsa febris acuta iam adsit, tunc ex symptomatibus illam comitantibus, ob vim vtero inflictam et suppressam sanguinis per vasa antea compressa excretionem eiusque stagnationem et stasim in corruptionem pronam, recte iudicamus statum vteri subesse inflammatorium, et secundum effatum D. MANNINGHAM *inflammationem vteri multum habere periculi, tum autem maxime, cum mulieri in primis a difficili partu diebus accidit*, arbitramur.

§. XXXVII.

Nostrum non est officium, paucis hisce lineis omnia enarrare, quæ spectant ad essentiam huius *febris*, differentiam ab aliis, et causarum nexum, utpote quæ specialem merentur considerationem. Paucissimis ea tantum complectemur, quæ ad specialem pertinent the-
E rapiam,

rapiam, medico quoad ineundam et feliciter perficiendam curationem scitu necessariam.

§. XXXVIII.

Inflammatio igitur vel *imminens* vel *præsens* corrigi solet venæ sectione iusto tempore instituta, antequam humores in corruptionem putredinosam abeant. Hanc quidem Galli Anglique sæpius reiterandam iubent, quæ vero methodus, nostris in terris pluribus displicet minusque conducit; id observare tantum licet, ut iusta sanguinis quantitas in plethoricis maxime euacuetur. Huic iungantur medicamenta interna leniter resolventia, discutientia et euacuantia, cui scopo inserviunt præprimis diluentia v. g. decocta ex rasur. cornu cerui, radice polypodii et graminis cum succo citri leniter acidulata, larga quantitate haurienda, deinde infusum aliquod aquosum ex rad. liquirit. cichor. gramin. herb. marub. alb. chamædr. meliss. flor. sambuc. chamom. vulg. præcipue autem floribus arnicæ, additis fœniculi vel carui seminibus, compositum.

§. XXXIX.

Commendamus vero illud, non ad *sudorem*, sed lenem usque *diapnoen* hauriendum, ante laudata vero præscribimus diluentia, humores spissos commotos tam resoluendi quam contemperandi causa, tenuibusque, quæ corpus nutriunt et conseruant, utimur carnium iusculis. Quo autem motus febrilis et humorum sanguinisque intestinus iusto celerior paululum infringatur

tur et contemperetur, confugimus ad *temperantia*, *lenia resoluentia* et *diapnoica*, qualia sunt nitr. depurat. lapid. cancror. citrat. corn. cerv. philosoph. præparat. antimon. diaphoret. succinum alb. præparat. cinnabar. vel in formam subtilissimi pulueris, vel cum aquis quibusdam destillatis, e. g. STAHLII diapnoicis, ceras. nigr. lilior. conuall. flor. tiliaë, borrag. bugloss. in mixturæ formam redacta, iisdemque pro concurrentium symptomatum ratione et individui dispositione sæpius die nocteue sufficiente quantitate vtimur, addendo si opus est, secura et conuenientia moderantia.

§. XL.

Reductis itaque omnibus in ordinem et fluxu lochiali restituto, quod præter medicamenta (§. XXXVIII. XXXIX.) laudata, repetito sæpius usu pilularum B. STAHLII in refracta dosi adhibitarum, vel oleo amygd. dulc. ad aliquot cochlearia quotidie adsumto, aut vno alteroue grano extract. cascarill. aquos. pulueri vel mixturæ (§. XXXIX.) remixto, obtinetur, cessantibusque motibus febrilibus, et facta morbi percrisin exoptatam solutione, tunc *tonicis* partes internæ et externæ roborandæ sunt, et regularis postea succedentis fluxus menstrui ratio semper habenda.

§. XLI.

Inter *roborantia* non medicamina tantum leniter adstringentia et balsamica, quæque motum solidorum tonicum augent referimus; verum quoque alimenta, quæ

corpus nutriunt, sicuti sunt tenuia et boni succi. E tonicorum classe interno vsui inferuentium poterunt eligi tinctura martis aperit. Ludouici, essent. cascarill. cort. aurant. succin. concentr. tinct. antimon. mixtur. tonic. neruin. STAHLII, externo autem suffitus et adstringentia (§. LX.) nec non spirituosæ ad vmbilicalem, inguinalem et lumborum regiones applicata, qualia sunt generosa vina, rubra, aqua regin. Hungar. cum tertia parte balsami vitæ, qui ex destillatis oleis subtilissimis æthereis, balsamoque peruuiano, in spiritu vini alcoholisato solutis præparari solet.

§. XLII.

Quodsi vero malum quoddam, ut plurimum curatu impossibile, ab inuersione vteri inductum, remaneat, *ulcerationesque cancrasæ* et vteri *indurationes* contingant, tunc eiusmodi morbus iniectionibus balsamicis mundificantibus et consolidantibus tractandus, febrique superuenienti, quæ extenuationem totius corporis efficit funestam, conuenientibus, quantum fieri potest, resistendum medicamentis sic dictis antiphthificis et antihecticis, quorum in numero primum hic obtinent locum serum lactis dulce et aquæ Selteranæ cum lacte asinino remixtæ, nec non iuscula carniū tenuia, infusa herbarum vulnerariarum leniterque adstringentium, imo succus ex iisdem expressus.

§. XLIII.

Prolapsus vteri licet ordinarie eiusmodi non comitentur symptomata, (§. XXVIII.) causa tamen sæpius fit
alio-

aliorum malorum, et sæpius quoque mortem producit, quare omnis periculi auertendi causa ratio curandi illa esse debet, ut præmissis præmittendis (oo) generalioribus, quæ vel aluum soluunt vel eandem ducunt, plethoram imminuunt, impuritates uterum obducentes, si emolli-
tæ prius fuerint (§. XXXIII.) detergantur (pp), uterus ad proprium locum reducatur, repositus ibi firmetur et roboretur, adeoque impediatur, quo minus sublata causa, quæ prolapsum excitabat, iterum decidat. DE-
VENTERIVS enim *huic inquit, malo, nisi nimium fu-
erit, in tempore remedium invenitur, incurabili autem, pes-
sarii accommodantur, prolapsionem præpedientes uterumque
sustinentes.*

§. XLIV.

Quod ad *modum reponendi* spectat, non opus est cu-
curbita

(oo) Conf. HIERONYM. MERCVRIALIS de morb. mu-
liebr. Lib. IV. et ALBERTIN. BOTTON. De morb. muliebr.
Cap. LXXII. Uteri ait, prociden-
tia cum morbus sit in situ, primum
et ante omnia in proprium locum
reponendus erit, quod autem hanc
repositionem prohibere potest, est
intestinorum et vesicæ repletio;
Ideo alvus imprimis lenienda cly-
stere et lotium pariter emitten-
dum erit, mox in propriam sedem
uterus intro mittendus, qui cum

*intestinum rectum et vesicam in-
teriaceat, ideo nisi prius hæc va-
sa inaniantur, a copia suarum su-
perfluitatum, in proprium locum
repositio impeditur. Vid. quo-
que LVD. MERCATVS lib. cit.
et IAC. SYLVIVS Lib. cit.*

(pp) Nonnulli vtuntur oleo
tepedo vel decocto ex beta, mal-
va, althea, semine lini, foenu
græci, additis cymino, baccis
lauri, chamæmelo etc.

curbita magna vmbilico imponenda, (qq) nec candela cerea, qua veteres nonnulli præprimis vfi ad contumaciorum retundendum vteri prolapsum, sed requiritur 1) apta mulieris collocatio, sublatis coxis, invicem dilatatis et reflexis poplitibus; (§. XXX.) quo chirurgus vel obstetrix, digitis scilicet indice, medio et annulari, butyro, vel oleo amygdal. dulc. inunctis prominentem plus minus vteri partem, inferiorem prius ad perinæum sitam, dein mediam, postea superiorem leniter et pedentim superius quantum fieri potest, ad locum naturalem reprimere possint. 2) Cum vteri non sufficiat repositio (§. XLIII.) sed vt repositus firmetur, concinnatum pessarium et Figur. I. expressum, ad capacitatem vaginæ, butyro prius inunctum, in vaginam secundum longitudinem ejus introducimus, dein si vterum superius attingit, mutato ejus prius in vagina situ, ita collocamus, vt pessarium parte a. a. os pubis vel supra illud, b. b. os sacrum, et obtusis extremitatibus c. c. ossa ilei respiciat, foramini vero ejus ovali d. d. et margini ejus obtuso e. e. e. e. orificium vteri incumbat.

§. XLV.

Quodsi pessarium vtero rite quidem appositum, breui post tamen, instituto leni corporis motu, rursus excidat,

(qq) Inter alia ad genus auxilii inutiliter refert ALBERTIN. BOTTON. cucurbitulas non scarificatas, si vmbilico et utrisque hypochondriis, cum magna flam-

ma, fuerint appositæ: has enim, putat, sursum trahendo, vim suspendendi vterum habere, et eundem in proprio domicilio retinendi.

cidat, aliud priori maius indicata methodo, habito tamen semper respectu ad vaginæ capacitatem, erit applicandum, quo eo firmitus in loco subsistens vterum in situ naturali retinere, mulier labores, exceptis grauioribus, peragere possit, simulque excretiones tam fluxus menstrui, quam aliarum impuritatum, quæ in rugis vaginæ colligi solent, nec non liquoris obascoeni et aluinæ, ordine et consueto tempore succedere valeant; interim cavendum, ne partibus adiacentibus vim inferant, vel dolores, tensiones, pressiones, inflammationes, vel corruptiones excitent.

§. XLVI.

Quando vero nobis sermo est de pessariis, silentio præterimus veterum medicamina oblonga, quæ in crassioris longiorisque digiti formam efformata, adversus vteri affectus varios HIPPOCRATES et alii commendarunt; sufficiat in præsentiarum ex recentioribus nonnullorum mentionem facere, quæ in eiusmodi affectibus usui venire solent. Sic SCHLEVOGTIVS *diff. de muliere gravida lapsu vaginæ vteri laborante*, recte censet PECHLINUM, qui ex cornu vervecis ramentis, et panni sericii centonibus, patellæ ignitæ iniectis, nec non aliam speciem, ex eodem serico, petroleo macerato, concinnatam laudat, potissimum ad causam, fibras flaccidas reddentem, respiciens, quam egregie emendare putat: sed haud tutum ubique esse probat, præprimis delicatioribus acre oleum petræ, teneræ cuticulæ vaginæ admovere, quia eam cum insigni ardore erodit; nouit enim a similibus morsicantibus, ad provocandos menses adhibitis, motus convulsivos excitatos, vt

vt injectionibus gelatinosis, abstergentibus, temperantibusque opus fuerit.

§. XLVII.

Nec nobis arrident *cerea*, qualia BARBETTE et SCVLTVS summis prædicant laudibus, asa *fætida*, et *castoreo*, obducenda, intus cava et filo propendente pro lubitu extrahenda, cum minus commode, sed libere potius vaginæ parietibus inhæreant, facillime sub leviori corporis motu, vel vrinam & alvum excernendi conatu foras iterum excidant, additaque nulli plane inferuiant vsui.

§. XLVIII.

Quid de *pilis*, *pomis*, *linteis conglomeratis*, *nucibus maioribus*, aliisque *imperforatis* instrumentis sentiendum sit, quilibet facile iudicabit, cui notum, a saburra corrupta, mora valde acri reddita, in vaginæ rugis finulisque collecta, novos gigni morbos externos massam humorum corrumpentes. Iudicat quidem ALBERTIN. BOTTONVS (rr) pilam aliquam formari debere, qua os vulvæ obduretur, ne foras iterum labatur, sed cum idem finis cum *perforatis* securius meliusque obti-

(rr) *Lib. cit. Cap. LXXIII.*
Parari iubet pessarium ex lana, posca, vel vino austero, prius imbuta, deinde expressa: in quibus si adstringentia etiam calida mace-

rata prius fuerint, vt *matricaria*, *mentha*, *nuces cupressi* et similia, addendo semper odorata et aromatica.

obtineri possit (§. XLV.) illud, vti et reliqua eiusdem indolis et figuræ fere, plane reiicimus.

§. XLIX.

SCHLEVOGTIVS ad modum VOELTERI *circulum paravit flexilem ex osse balenæ, lino et dein serico obvolutum, ceræ aliquoties immersum sedulo æquabilem redditum politumque, quo sub ovali figura intrusus, intus ad circularem rediret, et hoc pacto cavitatem commode expleret, vltioremque exitum ipsi præcluderet.* Quamvis vero cit. viros maiorem forsan, hac instrumenti specie præstitisse utilitatem prioribus inventis, lubentissime concedamus: negandum tamen non erit, illud pondere superare nostrum ex subere confectum, nec circulare cavitatem adeo explere, quam illud, quod ad ellipticam accedit figuram.

§. L.

Datur adhuc diversitas pessariorum, ratione *materiae*, ex qua arte confici solent. Dantur enim annuli ex ligno tornati aut ex subere sculpti, et cera incrustati, vel ex auro et argento confecti. Enobilioribus metallis præparatis DEVENTERIVS (ss) quidem *pessos argenteos vel aureos præfert, cævos atque levissimos, ne pondere incommo-* dent, *probeque levigatos, ne attritu lædant, doloremque in-* ferant; sed cum ejusmodi metalla, ratione præparationis ingrediantur veneris particulae, ab adhærentibus
F ipfis

ipsis humoribus excrementitiis mora corruptis, æuginosa quasi fiunt, partes arrodere, et ad inflammationem et corruptionem disponere solent.

§. LI.

Omnibus his palmam præripiunt *peffi suburei*, *cera alba* incrustati, quos molles nimis esse ac facile frangiquidem putat DEVENTERIVS, sed si rite fuerint præparati (tt), vsui per duos et plures adhuc inserviunt annos, mulieresque in vagina illos gerentes nec incommodum nec pondus, qualia ab aliis ex ligno tornatis, sentiunt. Quodsi enim præter omnem spem et opinionem, ob nimiam mollitiem, ex qualicunque causa, intus frangantur, aut vel ob calorem internum et acrem saburram, tam cera dissolvatur, quam eiusmodi lignum porosum corrumpatur, examinandum prius erit vtrum ligamenta priorem rursus nacti sint elasticitatem? et an opus adhuc sit novo quodam, pro vili pretio sibi comparando pessario? id quod iudicio medici et chirurgi discretiui examinandum relinquimus.

§. LII.

Præfert quidem hanc ob causam *ligneos* vtpote prioribus durabiliores, sed cum quæ præstare debent, præ-

(tt) Præservandi scopo contingentem nonnunquam brevi temporis intervallo, dictorum pessorum destructionem: eos probe incerandos esse commendat, ne corruptione partes ad putredinem disponant illisque exulcerationem dolorificam inferant.

præstent (§. LI.), specificè leviores sint ligneis, atque ita formati, ut mulier, non obstantibus illis, a viri amplexu gravida reddi possit, ligneos duriores mollioribus subureis inferiores esse arbitramur.

LIII.

Habemus denique diversæ figuræ pessos, quales Tibi B. L. Tabula adiecta sistit, et antea iam MAVRICAV, DEVENTERIVS, CELHEISTERVS, MESNARD delineandos curarunt, formam ellipticam circulo propius accedentes, triangulares cuius latera circularia sunt, orbiculares, rotundos fere quadrangulares etc. vel planos vel latos et profundos, certa quadam gaudentes digitorum latitudine magisque in obliquum vel acutum a circumferentia versus centrum desinentes: sed omnes figuræ excepta elliptica Fig. I, capacitati vaginæ haud respondent, cum, si vel excedant magnitudine, difficiles applicatu sint, et ab eiusmodi pessi gestatione mala producantur symptomata, sin vero minores quasi annuli, vel oui figuram referant, infirma sunt fundamenta, cum facile e genitalibus delabantur. Non autem, vel planis orbiculatis, vel cauis, tum in nuptis, quam innuptis ad mentem DEVENTERII opus est pessariis, quum sufficiant diversæ tantum magnitudinis præscripto modo conficienda et applicanda.

§. LIV.

Itaque pessarium Fig. I. quo felici cum successu

Excell. Dn. Præses in curatione horum morborum sæpius vsus est, præstantia reliqua omnia superat, vid. Fig. II. III. IV. V. VI. VII., Conficitur autem illud ad formam fere illius, quod Celeberr. HEISTERVS commendat, ex subere, cera alba sufficienter incrustato. Figuram habet *ellipticam*, et utraque superficies convexa f.f.f. crassitiem digiti refert, margines eiusdem perimetri in punctis a. a. a. b. b. b. et e. e. e. sunt obtusi, in medio d. gaudet foramine non orbiculatim perforato sicuti in quibusdam v. g. Fig. II. III. IV. VIII., sed ovali, quod humoribus excrementitiis intus collectis liberum concedit effluxum, nec concubitus impedit, sed aptas eiusmodi foeminas conceptui (uu) reddit. Sit præterea probe politum et lævigatum sine vlla acie vel scabritie, ne partes internas lædere queat.

§. LV.

Gravidis iam factis, quæ eiusmodi pessarium gerunt, vterique mole medio graviditatis termino aucta, e loco rursus movetur, illudque sua sponte excidit; interim vterus non procidit nisi, accedente partus negotio, vi motuum rursus propellatur. Huc spectat observatio PECHLINI, quando in muliere quadam, vastam vaginæ vterique procidentiam se observasse refert, quæ nullum aliud quæsiuit remedium, quam graviditatem.

§. LVI.

(uu) Vid. ROUSSETVS de partu casareo cap. VIII.

§. LVI.

In quibus itaque *dispositio* quædam ad *prolapsum vteri* obseruatur, tempestiue consilio et auxilio succurrendum est, ne in pristinum rursus incidant malum. Auxilium vero in partu fertur renisu digitorum nisui vteri versus digitos vtriusque manus directo æquali. (xx) Hoc enim modo impeditur, quo minus vterus vel in limen pudendi vel extra pudenda deprimatur. Si vero rursus ex qualicunque causa contigerit prolapsus, cessante penitus fluxu lochiali, tentanda erit vteri repositio (§. XXXI. et LXIV.).

§. LVII.

Tandem in difficiliore et *inueterato malo*, vbi repositio impossibilis, (yy) vel ob concurrentes alias rationes minime

(xx) RVYSCHIVS *observ. anat. med. chirurg. XXV. pag. 24.* Os vteri in partu prolapsus manu retinendum et denato foetu, placentam tota manu extrahendam esse docet, ne rursus prolapsus, vterusque inuertatur eo tempore ad inuersionem pronus. conf. quoque DEVENTER. *lib. cit. cap. XXIX. pag. 133.*

(yy) RVYSCHIVS *lib. cit. pag. 12. obs. IX.* cautelam aliquam practicam notatu dignam tradit. Demonstrat enim vterum, haud semper posse restitui, si extra partum diu e corpore prociderit, nec

semper opportunum esse illud moliri, nam norunt periti, qui antequam hoc suscipiant, semper vteri prolapsi constitutionem diuersam inuestigabunt: si enim a longo tempore prolapsus tantus sit factus, ut facili negotio in pristinum locum redigi haud possit, aut patiens vterum e longo tempore extra corpus gesserit, vel vterus prolapsus induruerit, cum inæquali superficie, aut ulcere obsessus fuerit, periculum haud faciendum; reposito enim vtero pessime sese habere solent agra.

minime suscipienda, in solatium et leuamen miserarum commendamus *subligaculum* SCHLEVOGTII, vel VOELTERI præcinctorium, quo uterus prolapsus tanquam in suspensorio quiescat.

§. LVIII

Facta vteri repositione ad interna et externa erit confugiendum medicamenta. Interne blande laxantia conducunt, omnia fortiora euacuantia contemnenda, (zz) aluus libera semper seruanda, status cachecticus et nimius vteri vel totius corporis mador, nec non alba purgamenta præprimis decoctis purificantibus et aliquatenus exsiccantibus ex rad. chin. lign. sanct. sant. rubr. sarsaparill. sem. fœnicul. interpositis resoluentibus antimoniatibus, mercurialibus et roborantibus succinatis corrigenda, venæ sectio urgente necessitate repetenda aliquoties, animi affectus (a) corporisque agitationes et motus vehementes, v. g. risus, clamores, vociferationes, sternutationes, labores nimii grossiores, nifus omnes, qui musculos abdominales ad constrictionem excitant, diæt

(zz) Pessimum est consilium HIPPOCRATIS lib. 2. de morb. mulier. vbi digitis alius in os immissis vomitum, cum aqua lentium, melle et aceto excitari iubet, quo sursum reuellatur vterus.

(a) B. HOFFMANNVS quidem *Pathol. general.* e PECHLI-

NO Lib. III. obs. 24. et ZACVTO LVSITANO Lib II. obs. 65. vterum prolapsum terrore sanatum fuisse refert, sed an hic fallacia causæ non causæ lateat? illis diiudicandum relinquo, qui cognitis huius prolapsus causis et vera indole, aliquoties eius curam susceperunt, nos interim habet dissentientes.

ta cruda et flatulenta, et supra adductæ (§. XXII.) causæ prolapsum excitantes, leuitandæ, regimen autem optimum diæteticum seruandum.

§. LIX.

Externa autem medicamenta tam partes roborandi quam tumores sæpius superuenientes inflammatorios, discutiendi causa adhiberi solent. Priora adstringentia extra fluxus menstrui tempus pudoris sinui inferenda, conueniunt cum illis, quæ in vaginæ relaxatione (§. LXI.) commendauimus: posteriora vero eadem sunt, de quibus (§. XXXIV.) actum fuit. Solent quidem nonnulli ad præscriptum SENNERTII, RIVERII, ETMULLERI hypogastrico et ossi sacro emplastra quædam applicare, sed vix virtutem præstare videntur, cum sæpissime vel pruritum vel pustulas excitent, quare eorum in locum substituimus spirituosæ, v. g. spirit. serpill. abstractit. camphorat. salis ammoniac. etc. vnguenta neruina et frictiones ad naturalem vsque calorem.

§. LX.

Restat vt paucis adhuc *curationem relaxationis uteri vaginæ* attingamus. Differt illa pro eo ac vel cum uteri prolapsu vel sine illo contingit. In priori casu reponatur vterus, indicata supra methodo, dein, vti etiam in posteriori casu, si mulier prius apte collocata fuerit (§. XXXI.) tunica relaxata propendens blandè ac leniter reprimatur, quoad tota moles intra sinum recipiatur. Hanc ad monitum HIPPOCRATES per aliquot dies

(quem-

(quemadmodum in genere in triplicis procidentiae curatione obseruandum est) in lecto quiescere iubet; interim adhibeantur externa adstringentia, quo extensio internae tunicæ breuior fiat. Inseruiunt huic scopo præprimis aqua aluminis, cum vel sine vino austero, ope latæ spongiæ vaginæ parietibus sæpius applicanda, mediante subligaculo autem vaginæ procidentia præcauenda. Potest quoque ex radicibus bistortæ, tormentill. fol. querc. herb. pyrol. cort. mali granati, fl. rosar. rubr. balaustior. nuc. cupress. terr. sigillat. gall. alumin. crud. in aqua ferrariorum vel plantaginis coctis, decoctum aliquod parari, genitalibus partibus aliquoties in die applicandum, vel tantum lanæ inuolucrum vino adstringente madidum ipsi imponi, postea autem aliud roborans ex herb. salv. lauend. thym. maior. rorismar. basil. bacc. et fol. laur. vino infusis substitui. Antequam autem hoc fiat, per peculiare quoddam instrumentum ad figuram infundibuli, quale R O V S S E T V S depingit, fere confectum, fumus, præparato prius e succino, thure, mastich. resin. iuniper. bals. peruv. sicc. et pelle anguill. suffimigio, carbonibus ignitis iniecto, in vaginam dirigatur.

§. LXI. *Pessariis* nonnulli in hoc malo vtuntur. Vnius tantummodo vt mentio fiat, vides B. L. Fig. eius VIII. tabula adiecta incisam. Inuentum est IAC. MESNARD, qui illius figuram primum *lib. supra cit. pag. 51. Tab. VIII.* delineandam curauit. Paratur pessarium diuersæ magnitudinis ex tenui et subtili linteo, cera quantum
satis,

fatis, obducitur, postea læuigatur, deinde butyro recenti inunctum prius orificio vaginæ apponitur, tandem, diductis a se invicem pollice et indice sinistræ manus labiis, et vagina in situm naturalem reposita, digitus medius dextræ manus orificio g. pessarii Fig. VIII. imponitur, et vaginæ solerter immittitur, ita quidem, vt orificium h. h. versus vteri os directum e diametro respondeat orificio g. illudque vna cum præcedente vaginæ procidentia, in loco naturali retineat. His peractis decoctum adstringens, ope peculiaris loc. cit. Tabul. IX. descripti siphunculi, vaginæ iniicitur, filo autem i. g. i. pessarium non retrahitur, cum per superius huius pessarii orificium h. h. ad vaginæ parietes medicamenti virtus penetrare possit.

§. LXII.

Methodus operandi non est reiicienda; maxime in *statu complicato*, quando vteri prolapsus simul cum vaginæ relaxatione contingit; sed notandum, laudatum pessarium teste auctore, (b) ponderosum

G

nimis

(b) *Libr. cit. p. 51.* On doit faire le pessaire avec du liège le plus fin que l'on puisse trouver, que l'on garnit, apres lui avoir donné une figure convenable, ou avec du linge fin, ou de l'étoffe de soye ou avec de la cire blanche: cette derniere, garniture doit etre préférée aux deux au-

tres: parceque quoique cet instrument devienne un peu plus pesant a porter, il se conserve aussi bien mieux que les autres et ne devient pas si-tot puant, attendu que la cire empeche que le liège, ne s'imbibe des humidites qui exudent continuellement du vagin et de l'orifice de la matrice.

nimis esse, interim corruptioni non statim obnoxium, vt reliqua. Quibus igitur pessarium nostrum Fig. I. displicet, quaecunque ex incisiss sibi eligant curationi huius morbi commodum.

§. LXIII.

Reposita itaque et constricta ac corrugata tunica interna, *causæ omnes* supra adductæ (§.XXV.), quæ eiusmodi relaxationem rursus producere valent, cane peius et angue fugiendæ sunt, interim dispositio corporis serosa et cachectica internis medicamentis corrigatur (§. LIX.), nimius humoris pituitosi ad genitalia affluxus præcaueatur, quod præmissis medicamentis internis purificantibus recto medicamentorum externorum adstringentium et suffimigiorum balsamicorum usu obtinetur, omnes deinde regulæ diæteticæ, ac contingente rursus graviditate præscriptæ cautelæ practicæ observentur (§. LVII.).

§. LXIV.

Equidem possem in diffusum adhuc exspatiari campum et quid ad præcavendas eiusmodi afflictiones pertinet, fusius enarrare. Possem præprimis certas leges et cautelas illis præscribere, quæ ob angustam pelvim vel situm foetus capitis obliquum, partum difficilem et vteri prolapsum experiuntur, simulque errores, qui in hac parte chirurgiæ a plurimis committuntur, ostendere. Possem denique, quid ratione præternaturalis
secun-

secundinarum adhæſionis, inversionem præcavendi ſcopo, faciendum? et an ad mentem RVYSCHII a ſolis naturæ viribus ſine vitæ discrimine exclusio placentæ naturalis expectanda ſit? ulterius explicare; ſed ne limites diſſertationis excedam, præmiſſis neceſſariis ad rem proprie ſpectantibus, ſilum hic abrumpo, et DEO immortalī pro conceſſis hætenus, in abſolvendo ſtudi-
orum meorum academicorum curriculo, viribus, gratias ago devotiſſimas, ſimulque, vt auxilium in ſu-
ſcipiendis ad eius gloriam conaminibus, in poſterum
quam clementiſſime mihi largiatur, ſummis ab
ipſo contendo precibus.

T A N T V M.



PRAENOBILISSIMO ATQVE PRAESTANTISSIMO
DOMINO CANDIDATO

S. P. D.

PRAESES.

Dum de quibusdam uteri et vaginae affectibus praesenti inaugurali specimine docte differere annisus es, praecclare docuisti, noxas in internis et externis corporis partibus contingentes valde inter se conspirare, hinc medico cognitum esse debere, quomodo non internis tantum morbis, sed et externis affectibus, tam ad vitam conservandam, quam sanitatem, quantum fieri potest, restituendam, medicamentis manuque medendum sit. Licet autem absolute necessarium non sit, ut
medicus

medicus exerceat artem chirurgicam, quæ ab antiquissimis temporibus a medicina fuit separata, præstat tamen in quauiscunque occasione, nisi auxilio, consilio tamen præesse, ne peritis imperfecta medici videatur esse mendendi ratio, neque ab eius ignorantia et infelici forsan experimento damnum ægrotis in perniciem generis humani inferatur. Laudandi igitur sunt conatus Tui, Præstantissime Domine Candidate, quod ex mixto foro materiam fructuosam ulterius euoluendam et defendendam in Te suscepseris, præsertim, quum positis laudabiliter in hac musarum sede tyrocinis, ad impetrandos decretos Tibi summos in medicina honores, veluti certa maiorum præmiorum auguria, cathedram iam iam adscendis. Ostendisti hætenus industriam singularem sitimque in addiscendis scientiis necessariis, nec non insignem in moribus probitatem. Plurimum sane debes viris immortalis memoriæ HOFFMANNO et SCHVLZIO subita probo dolor! et præmatura morte nobis abreptis, ex quorum doctissimis institutionibus adhuc didicisti principia medica rationalia physico-mechanica tam theoretica quam practica. Inter alios mihi quoque innotuisti, quum ad structuram corporis

G 3

humani

*humani Tibi probe cognitam reddendam tam
priuatis quam priuatissimis sectionibus, aliis-
que practicis exercitationibus diligenter in-
terfuisti. Itaque cum hodierna luce musis
nostris valedicens felicem laboribus academi-
cis imponis finem, magnum, quem hodie vi-
vis, diem, ex animo Tibi gratulor, simul-
que, ut supremum Numen illum, quem fata
remotissimorum temporum Tibi decernunt, fe-
licem faustumque esse iubeat, ex animo appre-
cor. Vale. Dab. Halæ d. XVIII. Iunii.
CLO IO CC XLV.*



Am

